Boulenger, G. A. Poisson cyprinodonte nouveau du Bas-Congo. (——)

HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

55,672

GIFT OF

Thomas Barbour.

November 26, 1920.

NOV 26 1920

55,672.

Tiré-à-part des publications de la Société des Naturalistes luxembourgeois.

LIBRARY
OF COMPARATIVE ZOOLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

Poisson Cyprinodonte nouveau du Bas-Congo.

Par **G. A. Boulenger.**

Le Musée de Luxembourg vient de recevoir de M. Luja quelques petits poissons recueillis par lui dans un petit ruisseau limpide à fond de gravier dans la forêt tout près de Kondué, Bas-Congo. Ces poissons, appelés dans le langage Bakubu „Bengkonko", ont été soumis à mon examen par M. V. Ferrant. Ce sont des Cyprinodontes du genre *Haplochilus*, et ils se rapportent à deux espèces : l'une, décrite par moi en 1899 sous le nom de *H. elegans*, d'après des individus pris à Bikoro et à Cocquilhatville par feu P. Delhez, l'autre nouvelle et pour laquelle j'ai le plaisir de proposer le nom du distingué Conservateur du Musée de Luxembourg.

Haplochilus Ferranti, sp. n.

Hauteur du corps 6 à 6 $^1/_2$ fois dans la longueur totale, longueur de la tête 3 $^2/_3$ à 4 fois. Tête plate en dessus, à machoire inférieure dépassant la supérieure ; diamètre de l'œil 3 $^1/_2$ fois dans la longueur de la tête, qui est le double de la largeur interoculaire. La nageoire dorsale, à 10 rayons, commence au-dessus du milieu de la base de l'anale, plus près de la racine de la caudale que de la tête ; le premier rayon correspond à la 18^{me} écaille de la ligne latérale ; l'anale a 13 rayons. La pectorale mesure presque les $^3/_4$ de la longueur de la tête et n'atteint pas la racine de la ventrale. Caudale arrondie ou arrondie-subacuminée, aussi longue que la tête. Pédicule caudal 1 $^2/_3$ fois aussi long que haut. 31 ou 32 écailles en série longitudinale, 8 en série transversale ; ligne latérale absente ou à peine indiquée par une série de points très faibles.

Brun en dessus et sur les côtes, d'un blanc sale en dessous ; une bande d'un beau jaune, continue ou interrompue, s'étend de chaque côté, depuis le bord supérieur de l'orifice branchial jusqu'à la base de la nageoire caudale ; nageoires dorsale et caudale brunes, tachetées de jaune ; de l'orange sur les pectorales et les ventrales. — Longueur totale : 5 centimètres.

Trois individus font partie de l'envoi de M. Luja.

P. WORRÉ-MERTENS, LUXEMBOURG.

LIBRARY
MUS. COMP. ZOÖLOGY.
CAMBRIDGE, MASS.

Gaylord Bros.
Makers
Syracuse, N. Y.
PAT JAN. 21, 1908